



# مرکز تصویر برداری پزشکی توسکا Tooska Medical Imaging center

آمادگی های لازم برای عکس برداری رنگی IVP :



خانم/ آقای محترم با آرزوی سلامت و بهبودی برای شما لطفا موارد زیر را جهت آمادگی برای رادیوگرافی

## IVP به دقت رعایت کنید:

- ۲۴ ساعت قبل از انجام آزمایش رژیم غذایی مایعات (سوپ صاف کرده، پوره جات، آب کمپوت، آب گوشت و...) را شروع کنید.
- ۱۲ ساعت قبل از آزمایش یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی استفاده نماید. در صورت یبوست؛ ۶۰ گرم روغن کرچک (یک شیشه و نصفی) استفاده نماید.
- ۳۰ دقیقه بعد از خوردن روغن کرچک، یک عدد قرص بیزاکودیل میل و یک عدد قرص دایمتیکون جویده شود (شکم باید کار کند...).
- بعد از خوردن روغن کرچک تا چهار ساعت قبل از انجام آزمایش میتوانید از مایعات مثل آب، چای، آب کمپوت (به غیر از شیر و نوشابه) استفاده نمایید.
- در صورتی که روده ها تخلیه نشده باشد و شکم کار نکرده باشد، ۲ ساعت قبل از انجام کار یک شیاف مقعدی بیزاکودیل استفاده گردد.

## مواد لازم که جهت انجام عکس رنگی IVP باید تهیه شود:

- یک شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی (در موارد یبوست دو شیشه روغن کرچک ۴۰ گرمی)
- یک عدد شیاف بیزاکودیل
- یک عدد قرص بیزاکودیل
- یک عدد آنژیوکت صورتی یا آبی
- یک عدد قرص دایمتیکون (جویدنی)
- سرنگ ۲۰ سی سی چهار عدد
- داروی حاجب که توسط پزشک رادیولوژیست مرکز نسخه می گردد.

آدرس: چهارراه پاسداران، فیابان دولت، بعد از افتخاریه، پلاک ۸۱، مرکز تصویربرداری پزشکی توسکا

فط ویژه ۰۵۷۴۶

تلفن جهت نوبت دهی: ۲۲۵۷۶۹۶۶ و ۲۲۵۴۷۶۳۵

